

**Compito di Istituzioni di Fisica Matematica**  
**15 Settembre 2025**

**Esercizio 1**

Si consideri la lagrangiana

$$L(q, \dot{q}) = \frac{1}{2}\dot{q}^2 - V(q), \quad V(q) = q \log |q|$$

con  $q, \dot{q} \in \mathbb{R}$ .

- i) Tracciare il ritratto di fase delle equazioni di Eulero-Lagrange per  $L$ .
- ii) Mostrare che la soluzione  $\bar{\gamma}(t)$  delle equazioni di Eulero-Lagrange con condizioni iniziali
$$\bar{\gamma}(0) = \frac{1}{e}, \quad \dot{\bar{\gamma}}(0) = \frac{1}{\sqrt{e}}$$
è una funzione periodica.
- iii) Dimostrare che esiste un valore positivo del tempo  $\bar{t} < +\infty$  coniugato a  $t = 0$ .

**Esercizio 2**

Si consideri la trasformazione di coordinate dipendente dal tempo

$$(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t) \xrightarrow{\Psi} (\mathbf{P}, \mathbf{Q}, t)$$

con

$$\mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathbb{R}^2, \quad t \in \mathbb{R}, \quad \mathbf{P} = R_t \mathbf{p}, \quad \mathbf{Q} = R_t \mathbf{q}, \quad R_t = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}.$$

- (i) Dimostrare che  $\Psi$  è canonica trovando una funzione generatrice della forma  $S(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t)$ .
- (ii) Estendere  $\Psi$  ad una trasformazione canonica

$$(\mathbf{p}, e, \mathbf{q}, t) \xrightarrow{\tilde{\Psi}} (\mathbf{P}, \mathcal{E}, \mathbf{Q}, t)$$

definita sullo spazio delle fasi esteso, in cui  $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$  sono definite da  $\Psi$  ed  $e, \mathcal{E} \in \mathbb{R}$  sono nuove variabili, coniugate al tempo.

- (iii) Scrivere il campo vettoriale

$$X = \begin{pmatrix} -\mathbf{q} \\ 0 \\ \mathbf{p} \\ 1 \end{pmatrix}$$

nelle nuove variabili  $(\mathbf{P}, \mathcal{E}, \mathbf{Q}, t)$  definite da  $\tilde{\Psi}$ .

**Esercizio 3**

Si consideri la hamiltoniana

$$H_\varepsilon(I_1, I_2, \varphi_1, \varphi_2) = \omega_1 I_1 + \omega_2 I_2 + \varepsilon f(\varphi_1, \varphi_2),$$

con  $\omega_1, \omega_2 > 0$  e

$$f(\varphi_1, \varphi_2) = \sin^2(\varphi_1 - \varphi_2)[\cos(\varphi_1 + 2\varphi_2) - 1]$$

definita per  $(I_1, I_2) \in \mathbb{R}^2$ ,  $(\varphi_1, \varphi_2) \in \mathbb{T}^2$ .

- i) Trovare la forma normale risonante di  $H_\varepsilon$  relativa alla risonanza singola definita da  $k = (1, 2)$ . Scrivere anche l'espressione della funzione generatrice  $\chi$  che definisce la trasformazione canonica  $\Phi_\chi^\varepsilon$  usata per passare a tale forma normale.
- ii) Descrivere l'andamento delle variabili di azione  $I_1, I_2$  al primo ordine in  $\varepsilon$  per la risonanza considerata e mostrare che in questo caso non vale il principio della media.